

tatarsus brevis, tarso haud vel vix longior, aculeis longioribus 2-2 subtus numitus. Pedes-maxillares (fig. 14) nigro-olivacei; femore sat longo, mutico; patella mutica; tibia patella brevior, apophysii exteriori sat brevi et fere aequaliter bifida apophysique inferiore longiore, gracili et extus uncatata armata (fig. 14 a); tarso sat longo, teretiuseculo; bulbo simplici. ad basin intus convexo, nec emarginato nec cornuto.

Arabia: Aden! Cheick Othman!

*H. lucipeta* E. Simon, qui se trouve aussi à Aden et de plus en Égypte et à Obok, est voisin de *H. suedicola* E. Sim. dont il diffère cependant par le tibia de sa patte-mâchoire entièrement mutique et annulaire, le tarse plus petit et plus acuminé (fig. 15).



Fig. 15.

## XLIX

### Descriptions de quelques Salticides de Hong-Kong faisant partie de la collection du Rév. O.-P. Cambridge.

**Thiania chrysogramma**, sp. nov. — ♀ long. 6 mill. — Cephalothorax niger, nitidus (fere omnino depilis), parte cephalica squamulis argenteis conspersa, thoracica linea marginali exili albo-pilosa cineta. Pili oculorum pauci, albi. Clypeus angustus, sub oculis nudus, ad marginem pilis albis longis decumbentibus uniseriatis ornatus. Abdomen oblongum, depressiusculum, supra atrum, postice in medio paulo dilutius, antice linea marginali sat exili. postice lineis similibus binis, antice convergentibus et medium fere attingentibus, ex squamulis albis viridibusque micantibus mixtis, supra decoratum; subtus atrum, parce pilosum et utrinque testaceo-marginatum. Chelae breves, sed robustae et convexae. antice ad basin coriaceae, prope medium transversim rugatae, ungue brevi, robusto et subrecto, apice rubro. Partes oris, sternum, pedes-maxillares pedesque 1<sup>i</sup> paris omnino nigra. Pedes 2<sup>i</sup> et 3<sup>i</sup> parium nigri, coxis metatarsis tarsisque luteis et tibia 3<sup>i</sup> paris superne fulvo bilineata. Pedes 4<sup>i</sup> paris lutei, femore, basi excepto, patellaque nigricantibus. tibia utrinque metatarsoque ad basin nigricanti-lineatis. Plaga genitalis maxima, rubra, cordiformis, foveolis magnis ovatis binis, postice oblique convergentibus, impressa.

**Telamonia mustelina**, sp. nov. — ♂ long 5 mill. — Cephalothorax nigricans, parte thoracica late dilutiore et rufescenti-tincta, vitta

submarginali lata, vitta frontali latissima, utrinque, inter oculos, macula obliqua, atque in parte thoracica maculis minoribus trinis albo-argenteo-squamulatis decoratus. Pili oculorum supra oculos et intus nivei, extus coccinei. Clypeus latus, macula media cordiformi nivea ornatus. Abdomen sat anguste ovatum, supra crebre luteo-nitido-squamulatum et vitta media lata et integra fulvo-rufula ornatum. Chelae longae sed verticales, antice deplanatae et apice leviter divaricatae, coriaceo-opacae, nigrae sed versus apicem leviter dilutiores et rufescentes, margine inferiore sulci longe obliquo, dente remoto armato, ungue longo. Partes oris nigricantes. Sternum obscure fulvum, parce albo-squamulatum. Mamillae superiores luteae, inferiores nigrae. Pedes quatuor antici nigricantes, tibiis annulo medio dilutiore et albo-squamulato ornatis, metatarsis tarsisque luteis, metatarsis apice fuscis. Pedes quatuor postici lutei, plus minus fusco-variati. Pedes-maxillares lutei, albo-pilosi, femore ad basin minute nigro; tibia patella paulo brevior, extus convexa atque ad marginem apicalem apophysii parva, nigra et acuta armata; bulbo apice acuminato, ad basin dilatato et obtuse truncato, cum angulo interiore obtuso leviter prominulo.

**Epocilla picturata**, sp. nov. — ♂ long. 4 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, vitta media lata, oculos anticos fere attingente, et utrinque vitta submarginali pallide luteo-squamulatis ornatus, parte cephalica antice et utrinque, prope oculos, coccineo-pilosa, thoracica, inter vittas luteas, nigricanti-pilosa. Pili oculorum supra et inter oculos coccinei, subtus lutei. Clypeus sat latus, in medio glaber et niger, utrinque in genis crebre luteo-squamulatus. Abdomen angustum et longum, supra crebre rufulo-nitido-squamulatum, utrinque vitta marginali lata et integra, antice vitta media minore et abbreviata pallide luteo sed nitido-squamulatis ornatum, subtus albo-squamulatum. Chelae rufulae, parce rugosae. Sternum pedesque sex posteriores lutea. Pedes 4<sup>i</sup> paris obscure olivacei, femore et supra et subtus infuscato et subvittato, tibia ad basin atque ad apicem infuscata, metatarso tarsoque luteis, femore subtus mutico, tibia subtus aculeis 4-4, apicali interiore, reliquis robustiore et dentiformi, munita. Pedes-maxillares graciles, lutei, tarso fusco-rufulo; tibia patella brevior et angustior, apophysibus exterioribus binis, altera parva conica et divaricata, altera apicali acuta et uncatata armata; tarso anguste ovato; bulbo ovato, ad basin attenuato et producto, ad apicem stylo parvo uncatato et dentiformi munito.

Ab *E. aurantiaca* E. Sim. (*praetextata* Thorell) praesertim differt vittis abdominis et cephalothoracis luteis, haud niveis, et tibia pedum-maxillarium maris apophysibus binis extus munita.

**Ocrisiona** E. Simon (H. N. Ar. 41, p. 608).

Ab *Holoplatidi* differt cephalothorace paulo minus depresso, parte cephalica haud impressa, thoracica sulco medio longiore munita, oculis anticis inter se paulo minus iniquis, a margine clypœo angusto sejunctis, chelis robustioribus, margine superiore sulci dentibus angularibus binis geminatis, inferiore dente parvo singulo instructis. sterno antice longe acuminato et canaliculato sed postice non marginato, abdomine depressiusculo, longe ovato, haud striato, tibiis anticis subtus aculeis brevibus et erectis interioribus 2 vel 3 uniseriatis, rarissime aculeis biseriatis 3-3, sed exterioribus semper minutissimis, armatis, metatarsis quatuor anticis superne deplanatis, subtus aculeis brevibus 2-2 minutis, metatarsis quatuor posticis aculeis parvis apicalibus armatis — typus *O. (Marptusa) leucocomis* L. Koch.

**O. frenata**, sp. nov. — ♂ long. 7 mill. — Cephalothorax niger, sublaevis, in medio pilis brevibus fulvis, utrinque in declivitate pilis densioribus sordide-albidis vestitus. Pili oculorum pauci, obscure fulvi. Abdomen longum, depressiusculum, supra in medio parce fusco rubroque pilosum, utrinque paulo dilutius et albido-pubescens, subtus atrum, fere nudum, vitta media angusta paulo dilutiore et postice utrinque macula albo-pilosis ornatum. Chelae sat longae, divaricatae et leviter arcuatae, subtiliter rugosae et antice linea albo-pilosa ornatae, margine inferiore sulci longo, dente valido remoto armato, ungue longo apice rubro. Partes oris sternumque nigro-picea, fere glabra. Pedes 1<sup>i</sup> paris fusco-rufuli, femore fere nigro, tarso fulvo, femore clavato. tibia teretiuscula, subtus longe sed tenuiter et parce pilosa. Pedes sex postici fulvo-rufuli, confuse annulati, coxis femoribusque fusco-olivaceis, tibia 4<sup>i</sup> paris subtus aculeis 3-3 exterioribus minutissimis, vix perspicuis, armata. Pedes-maxillares fusco-picei, patella dilutiore, femore patellaque et intus et extus, tibia intus longissime albo-crinitis; tibia apophysii apicali articulo fere duplo longiore, antice directa, gracili, acuta et leviter sinuosa armata; tarso sat late ovato; bulbo magno, convexo, simplici.

**Pseudamycus relucens**, sp. nov. — ♂ long. 7-8 mill. — Cephalothorax convexus, parte cephalica supra nigro-aenea, rubro-pilosa, macula media subrotunda albo-pilosa, subsquamulata ornata, utrinque sub oculis longius albo-pilosa, thoracica fusco-rufescenti, maculis mediis binis vittaque marginali albis ornata. Pili oculorum supra oculos et extus aurantiaci, subtus nivei. Clypeus angustus, fere glaber. Ab-

domen oblongum, fulvum, rubro-pubescens et vittis nigris binis notatum, in parte basali vitta marginali arcuata, vitta media lineaque transversa albido-pilosis, in parte altera vitta media latiore micantissquamulata et utrinque punctis binis niveis decoratum, subtus parcius aurantiaco-pilosum et utrinque albo-marginatum. Chelae sat longae sed verticales, nigro-opacae, valde coriaceo-granulosae, ad basin et intus setis valde clavatis pilisque niveis ornatae. Partes oris castaneae. Sternum fulvo-olivaceum. Pedes quatuor antici fusco-rufuli. metatarsis ad basin tarsisque luteis, femoribus patellis tibiisque supra annulis latis albo-pilosis ornatis. Pedes quatuor postici lutei, late annulati. Pedes 3<sup>i</sup> paris pedibus 4<sup>i</sup> paris non multo longiores sed paulo crassiores. Metatarsus 4<sup>i</sup> paris tibia longior. Pedes-maxillares sat graciles, fulvi, nigro-criniti; tibia patella brevior. extus apophysi apicali, articulo longior, sat gracili, arcuata et antice directa, dimidium tarsum attingente, armata: tarso parvo et angusto; bulbo parvo sed spina longa et obliqua munito.

**P. bicoronatus**, sp. nov. — ♂ long. 6 mill. — Cephalothorax crassus. parte cephalica nigro-nitida, fulvo-rufulo-pubescenti sed ad marginem frontalem late albo-pilosa, parte thoracica fusco-rufula, versus marginem sensim obscuriore, vitta transversa semicirculari latissima, in medio interrupta, vittaque marginali angustiore albo-pilosis ornata. Pili oculorum supra oculos albi, inter oculos et subtus fulvo-rufuli. Clypeus sat angustus, glaber. Abdomen anguste ovatum. supra flavo-pubescens et vitta media integra albo-pilosa ornatum, subtus atrum et fere glabrum. Chelae nigrae, subtiliter rugosae et sinuoso-striolatae, margine inferiore sulci brevi, dente valido, parum remoto, armato. Sternum nigrum. Pedes quatuor antici nigerrimi, tarsis luteis, femoribus supra ad apicem albo-pilosis, patellis, tibiis metatarsisque subtus crebre et longe nigro-hirsutis. Pedes postici nigri, albo nigroque pilosi, femoribus, tibiis (praesertim IV) annulo medio lato fulvo notatis, metatarsis tarsisque luteis, sed metatarsis apice fuscis. Metatarsi 4<sup>i</sup> paris breves, aculeis inferioribus validis et longis 2-2 aculeoque parvo apicali interiore muniti. Pedes 3<sup>i</sup> paris pedibus 4<sup>i</sup> paris haud vel vix longiores sed paulo robustiores, tibia 3<sup>i</sup> paris apicem versus leviter incrassata. Pedes-maxillares robusti, nigri, nigro-hirsuti sed tarso apice albo-piloso; tibia brevi, extus ad apicem apophysi longa recta et antice directa, valida sed apice abrupte acuta, armata; tarso late ovato, depressiusculo; bulbo simplici, in medio convexo.

**Phlegra micans**, sp. nov. — ♂ long. 3, 5 mill. — Cephalothorax niger, laevis, pilis obscure fulvis sed micantibus parce vestitus, ad mar-

ginem et postice in declivitate pilis longioribus albis paucis munitus. Oculi antici saltem medii, smaragdinei, pilis albis longis, cincti. Clypeus oculis mediis vix angustior, pilis albis, crassis et longis parum dense vestitus. Abdomen sat longe oblongum, pilis simplicibus pronis rubro-viridi-micantibus vestitum et linea alba omnino marginatum, subtus atrum et obscure fulvo-pubescens. Chelae nigrae, antice pilis albis decumbentibus fere usque ad apicem vestitae. Partes oris sternumque nigra. Pedes nigri, tarsis quatuor posticis apice luteis. Pedes-maxillares nigri, femore ad apicem, patella tibiaque supra crasse niveo-pilosis; tibia brevi, extus ad apicem apophysibus brevibus binis: inferiore uncatata, superiore crassiore et subrotunda, armata; tarso sat angusto; bulbo ovato, valde convexo, ad basin attenuato et producto.

**P. semipullata**, sp. nov. — ♂ long. 4 mill. — Cephalothorax niger, laevis, pilis obscure fulvis pronis parum dense vestitus, parte thoracica striis valde arcuatis et angulosis et postice in declivitate vittis abbreviatis binis albo-pilosis notata. Oculi antici smaragdinei, pilis luteo-fulvis cincti. Clypeus latus, oculis mediis vix angustior, pilis longis et erectis luteo-fulvis sat crebre vestitus. Abdomen atrum, supra crebre cinereo-fulvo-pubescens et lineis binis rectis et integris fusco-rufulis notatum, subtus atrum, obscure fulvo-pubescens. Chelae nigrae, leviter striatae et rugosae, ad basin pilis luteis longis decumbentibus ornatae. Pedes nigricantes, nigro-hirsuti et cinereo-albo-pilosi, quatuor postici apice dilutiores et castanei. Pedes-maxillares nigri, femore supra vitta niveo-pilosa ornato; tibia patella brevior, extus ad apicem apophysibus binis brevibus inter se subaequis armata; tarso angusto; bulbo ovato, valde convexo, ad basin attenuato et producto.

**Ptocasius strupifer**, sp. nov. — ♂ long. 6 mill. — Cephalothorax valde convexus, niger et nitidus (fere omnino depilis), parte thoracica macula media longitudinali albo-pilosa notata. Pili oculorum breves, supra et inter oculos coccinei, subtus albi. Clypeus oculis mediis duplo angustior, fere glaber, ad marginem pilis tenuibus cinereis paucis munitus. Abdomen oblongum, supra nigrum, vitta latissima integra, paulo dilutior et niveo-pilosa ornatum, subtus atrum et parce albo-pilosum. Chelae validae et convexae, nigro-nitidae, leviter transversim striatae. Partes oris sternumque nigro-nitida. Pedes antici fusco-castanei, femoribus nigris, tarsis luteis, pedes postici dilutiores sed femoribus infuscatis, metatarsis tarsisque luteis. Tibiae metatarsisque antici subtus longe pilosi sed non limbriati. Metatarsi antici aculeis inferioribus 2-2 et utrinque lateralibus minoribus binis muniti, metatarsi 3<sup>i</sup> paris aculeis biverticillatis, metatarsis 4<sup>i</sup> paris aculeis triverticillatis

instructi. Pedes-maxillares fusco-rufuli, parce nigro-criniti; tibia patella minore, extus apophysi apicali, antice directa, acuta et leviter incurva, armata; tarso ad basin lato et extus dilatato sed ad apicem valde attenuato; bulbo obliquo, conico, ad basin attenuato sed obtuso. et intus stylo libero longo marginato.

## L

**Descriptions d'espèces nouvelles**  
de la famille des Salticidae (*suite*).

**Hargus coccineus**, sp. nov. — ♂ long. 4 mill. — Cephalothorax laevis, fusco-piceus, maculis ocularibus latis nigris munitus, supra flavo-coccineo-pubescens, utrinque in declivitate parcius albidopilosus, parte cephalica vitta media lata albido-coeruleo-pilosa ornata. Pili oculorum albidi. Pili clypei in medio longi et densi, albido-lutei. Abdomen angustum et longum, supra atrum, crebre cinereo-albidosquamulatum et vittis binis latis, postice convergentibus et saepe confluentibus, laete coccineo-squamulatis ornatum, subtus pallide testaceum, parce et tenuiter albo-pilosum, mamillis nigris. Chelae breves et subglabrae, fulvo-rufulae. Sternum nigrum. Pedes omnino lutei. Pedes-maxillares nigri vel fusci, superne coccineo-pilosi; tibia patella brevior, extus ad apicem apophysi longissima, antice secundum tarsum, directa, gracili et apice inaequaliter bitida armata; tarso breviter ovato, obtuso; bulbo magno, apice stylo semicirculari munito.

Brasilia (prov. Minas) : Caraca (E. Gounelle).

**Saitis catulus**, sp. nov. — ♂ long. 3 mill. — Cephalothorax niger, laevis, supra luteo-albido-pubescens, antice ad marginem frontalem et utrinque in declivitate longius rufulo-pilosus. Pili oculorum rufuli. Clypeus subglaber. Abdomen oblongum, fuscum, supra longe luteo-albido-pubescens, parce fusco-punctatum, antice macula parva longitudinali, postice utrinque macula majore nigricantibus et rufulo-pilosis ornatum, subtus albo-luteo-pubescens. Sternum fusco-olivaceum, laeve. Chelae nigrae, apice rufescentes, parce transversim striolatae. Pedes fusco-castanei, valde luteo-annulati, luteo-rufuloque pilosi. Pedes-maxillares fusci; tibia patella brevior, extus ad apicem apophysi gracili, antice secundum tarsum directa et articulo longiore, armata; tarso sat late ovato; bulbo magno sed simplici, ad basin anguloso et breviter producto.

Venezuela : Caracas!